がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	CapeOX	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		カペシタビン	2000mg/㎡/日	day1(夕)-day15(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	CapeOX +Bmab	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	
		カペシタビン	2000mg/㎡/日	day1(夕)-day15(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	SOX	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	21日間
		S-1	80mg/㎡/日	day1(夕)-day15(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	SOX+Bmab	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	
		S-1	80mg/㎡/日	day1(夕)-day15(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	FOLFOX4	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	14日間
		レボホリナート	100mg/㎡	day1,2	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1,2	点滴静注	
		5-FU	600mg/㎡	day1,2	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	FOLFOX4+Bmab	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	
		レボホリナート	100mg/㎡	day1,2	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1,2	点滴静注	
		5-FU	600mg/㎡	day1,2	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	FOLFOX4+Cmab	セツキシマブ	初回 400mg/㎡ 2回目以降 250mg/㎡	day1	点滴静注	14日間
		オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	
		レボホリナート	100mg/㎡	day1,2	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1,2	点滴静注	
		5-FU	600mg/㎡	day1,2	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	FOLFOX4+Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	
		レボホリナート	100mg/㎡	day1,2	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1,2	点滴静注	
		5-FU	600mg/㎡	day1,2	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	mFOLFOX6 (インフューザーポンプ)	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	14日間
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	2400mg/㎡	day1-2	点滴静注 (インフューザーポンプ)	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	mFOLFOX6 +Bmab (インフューザーポンプ)	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	2400mg/㎡	day1-2	点滴静注 (インフューザーポンプ)	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	mFOLFOX6 +Pmab (インフューザーポンプ)	パニツムマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	2400mg/㎡	day1-2	点滴静注 (インフューザーポンプ)	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	FOLFIRI	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	14日間
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	2400mg/㎡	day1-2	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	FOLFIRI+Bmab	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	2400mg/㎡	day1-2	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	FOLFIRI+Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	2400mg/㎡	day1-2	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	FOLFIRI+RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	2400mg/㎡	day1-2	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	FOLFIRI+Bmab (インフューザーポンプ)	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	2400mg/㎡	day1-2	点滴静注 (インフューザーポンプ)	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	FOLFIRI+Pmab (インフューザーポンプ)	パニツムマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	400mg/㎡	day1	点滴静注	
		5-FU	2400mg/㎡	day1-2	点滴静注 (インフューザーポンプ)	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	SIRB	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	
		S-1	80mg/㎡/日	day1(夕)-day15(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	IRIS+Bmab	ベバシズマブ	5mg/kg	day1,15	点滴静注	28日間
		イリノテカン	100mg/㎡	day1,15	点滴静注	
		S-1	80mg/㎡/日	day1(夕)-day15(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	CPT-11+Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	Cmab	セツキシマブ	初回 400mg/㎡ 2回目以降 250mg/㎡	day1	点滴静注	7日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	CapeIRI +Bmab	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		イリノテカン	200mg/㎡	day1	点滴静注	
		カペシタビン	1600mg/㎡/日	day1(夕)-day15(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	FTD/TPI +Bmab	ベバシズマブ	5mg/kg	day1,15	点滴静注	28日間
		トリフルリジン ・チピラシル	70mg/㎡/日	day1(夕)-day6(朝) day8(夕)-day13(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	エンコラフェニブ +ビニメチニブ +Cmab	セツキシマブ	初回 400mg/㎡ 2回目以降 250mg/㎡	day1	点滴静注	7日間
		エンコラフェニブ	300mg/日	連日	内服	
		ビニメチニブ	90mg/日	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	ペムブロリズマブ (3週毎)	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
大腸癌	ペムブロリズマブ (6週毎)	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	点滴静注	42日間