がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	EC	エピルビシン	90mg/m²	day1	点滴静注	21日間
子し7四	LO	シクロフォスファミド	600mg/m²	day1	点滴静注	211111
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	dose dense EC	エピルビシン	90mg/m²	day1	点滴静注	14日間
3 б/Щ	4000 401100 20	シクロフォスファミド	600mg/m²	day1	点滴静注	2.1112
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
		エピルビシン	100mg/m²	day1	点滴静注	
乳癌	FEC100	シクロホスファミド	500mg/m²	day1	点滴静注	21日間
		5-FU	500mg/m²	day1	点滴静注	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
		エピルビシン	60mg/m²	day1	点滴静注	
乳癌	FEC60	シクロホスファミド	600mg/m²	day1	点滴静注	21日間
		5-FU	600mg/m²	day1	点滴静注	
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	TC	ドセタキセル	75mg/m²	day1	点滴静注	21日間
толщ	10	シクロホスファミド	600mg/m²	day1	点滴静注	211111
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	DTX	ドセタキセル	75mg/m²	day1	点滴静注	21日間
	(75mg/㎡)					
		,				
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	DTX (60mg/㎡)	ドセタキセル	60mg/m²	day1	点滴静注	21日間
	(00111g/111 <i>)</i>					
				1		
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	dose dense PTX	パクリタキセル	175mg/m²	day1	点滴静注	14日間
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m²	day1	点滴静注	7日間
ナレク出	(術前・術後)	ハノリスイビル	ouing/ III	uayı		1 口目
がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m²	day1,8,15	点滴静注	28日間
ナレ7出	(進行・再発)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	oumg/ III	uay1,0,13	二十年的二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	스이디 [비]

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	
(術前)	+PTX+CBDCA	パクリタキセル	80mg/m²	day1,8,15	点滴静注	21日間
(נים ניוין)	TITATOBBOA	カルボプラチン	AUC1.5	day1,8,15	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
刘倞	乳癌 ペムブロリズマブ (術前) +EC	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	
(術前)		エピルビシン	90mg/m²	day1	点滴静注	21日間
(נוּשׁ נווּע)	1 LC	シクロホスファミド	600mg/m²	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200 mag / b a du	day1	点滴静注	21 □ 閏
(術後)	ヘムノロリスマノ	ヘムノロリスマノ	200mg/body	day1		21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
	ペルツズマブ+ トラスツズマブ+DTX	ペルツズマブ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	day1	点滴静注	
乳癌		トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		ドセタキセル	75mg/m²	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	トラスツズマブ + DTX	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	点滴静注	21日間
	· DIX	ドセタキセル	75mg/m²	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	フェスゴ + DTX	ペルツズマブ トラスツズマブ ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合皮下注	初回 IN 2回目以降 MA	day1	点滴静注	21日間
		ドセタキセル	75mg/m²	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	ペルツズマブ	ペルツズマブ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	day1	点滴静注	21日間
子の揺	+ トラスツズマブ	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	フェスゴ	ペルツズマブ トラスツズマブ ポルヒアルロニダーゼ アルファ配合皮下注	初回 IN 2回目以降 MA	day1	皮下注射	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	トラスツズマブ	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	トラスツズマブ	トラスツズマブ	2 6mg/kg	dov1	点滴静注	21日間
北 畑	エムタンシン	エムタンシン	3.6mg/kg	day1	点间	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	トラスツズマブ	トラスツズマブ	5.4mg/kg	day1	点滴静注	21日間
3074	デルクステカン	デルクステカン	3. IIII 6/ N.S	dayı	7///HI HI / 7	211111

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
	ペルツズマブ	ペルツズマブ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	day1	点滴静注	
乳癌	+トラスツズマブ +エリブリン	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		エリブリン	1.4mg/m²	day1,8	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m²	day1,8,15	点滴静注	28日間
子 07階	+ Bmab	ベバシズマブ	10mg/kg	day1,15	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	840mg/body	day1,15	点滴静注	28日間
和海	+ nab-PTX	ナブパクリタキセル	100mg/m²	day1,8,15	点滴静注	2011 [8]

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
	CBDCA+GEM	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	
乳癌	CBDCA+GEM +ペムブロリズマブ	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1,8	点滴静注	21日間
	T T A / A / A / A	カルボプラチン	AUC2	day1,8	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	PTX	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間
子67出	+ペムブロリズマブ	パクリタキセル	90mg/m²	day1,8,15	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	エリブリン	エリブリン	1.4mg/m²	day1,8	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
刘占	サシツズマブ	サシツズマブ	10mm er /le er	dou1.0	上这卦计	21 □ 閏
乳癌	ゴビテカン	ゴビテカン	10mg/kg	day1,8	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	nab-PTX	ナブパクリタキセル	260mg/m²	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	GEM	ゲムシタビン	1250mg/m²	day1,8	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	VNR	ビノレルビン	25mg/m²	day1,8	点滴静注	21日間