

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
前立腺癌	DTX+PSL (CRPC)	ドセタキセル	70mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		プレドニゾン	10mg/日	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
前立腺癌	カバジタキセル +PSL	カバジタキセル	25mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		プレドニゾン	10mg/日	day1	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
前立腺癌	DTX+ADT (mHSPC)	ドセタキセル	75mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		ADT				

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
前立腺癌	DTX+ADT +ダロルタミド	ドセタキセル	75mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		ダロルタミド	1200mg/日	連日	内服	
		ADT				

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
腎細胞癌	ニボルマブ +イピリムマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	点滴静注	21日間
		イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
腎細胞癌	ニボルマブ (2週毎)	ニボルマブ	240mg/body	day1	点滴静注	14日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
腎細胞癌	ニボルマブ (4週毎)	ニボルマブ	480mg/body	day1	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
腎細胞癌	ペムプロリズマブ +アキシチニブ (3週毎)	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		アキシチニブ	10mg/日 (開始用量)	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
腎細胞癌	ペムプロリズマブ +アキシチニブ (6週毎)	ペムプロリズマブ	400mg/body	day1	点滴静注	42日間
		アキシチニブ	10mg/日 (開始用量)	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
腎細胞癌	ペムプロリズマブ +レンバチニブ	ペムプロリズマブ	400mg/body	day1	点滴静注	42日間
		レンバチニブ	20mg/日	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
尿路上皮癌	GEM+CBDCA	ゲムシタピン	1000mg/m ²	day1,8,15	点滴静注	28日間
		カルボプラチン	AUC4.5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
尿路上皮癌	GEM+CBDCA	ゲムシタピン	1000mg/m ²	day1,8	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC4.5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
尿路上皮癌	GEM+CDDP	ゲムシタピン	1000mg/m ²	day1,8,15	点滴静注	28日間
		シスプラチン	70mg/m ²	day2	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
尿路上皮癌	GEM+CDDP	ゲムシタピン	1000mg/m ²	day1,8	点滴静注	21日間
		シスプラチン	70mg/m ²	day2	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
尿路上皮癌	アベルマブ	アベルマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	14日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
尿路上皮癌	ニボルマブ (術後)	ニボルマブ	480mg/body	day1	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
尿路上皮癌	エンホルツマブ ベドチン +ペムプロリズマブ	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	day1,8	点滴静注	21日間
		ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
尿路上皮癌	エンホルツマブ ベドチン	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	day1,8,15	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
尿路上皮癌	ペムプロリズマブ (3週毎)	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
尿路上皮癌	ペムプロリズマブ (6週毎)	ペムプロリズマブ	400mg/body	day1	点滴静注	42日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
尿路上皮癌	ピラルピシン	ピラルピシン	30mg	day1	膀胱内注入	-